



Aqrar Xidmətlər  
Agentliyi

# ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU



## Əhəmiyyəti

- Azərbaycanda yeganə **şəkər** istehsalı mənbəyidir
- Ondan həm **şəkər** istehsalı üçün, həm də heyvandarlıqda **yem** kimi istifadə olunur
- Tərkibində 18-22 % şəkər vardır
- Yemlilik dəyərinə görə yem çuğundurundan 2 **dəfə** üstündür
- Yarpaqları **qida elementləri** ilə daha zəngindir
- Yarpaqlarda 2-3 % zülal, 0,4 % **yağ** və müxtəlif **vitaminlər** vardır
- Şəkər çuğundurunun 1 sentneri 26 **yem vahidinə**, yaxud 1,2 kq **proteinə** bərabərdir
- Yarpağın 1 sentneri isə 20 **yem vahidinə** bərabərdir. Yem çuğundurunda isə müvafiq olaraq 12 **və** 9 **yem vahidinə** bərabərdir
- Şəkərin emalından sonra zavodlarda çoxlu tullantılar alınır ki, bu tullantılardan **spirt**, **qliserin**, **pektin kleyi** istehsalı üçün istifadə edilir
- Eyni zamanda bu tullantıdan heyvandarlıqda **yem** kimi və təsərrüfatlarda **üzvi gübrə** kimi də istifadə olunur
- Tullantının 1 sentneri 85 **yem vahidinə** bərabərdir



## Şəkər çuğundurunun səpini

- Toxumlar cərgəarası 45-50 sm, bitki araları 10-15 sm olmaqla, ağır torpaqlarda 2-3 sm, yüngül torpaqlarda isə 4-5 sm dərinlikdə basdırılır
- Hər hektara səpin norması 10-12 kq, dəqiq səpinlərdə isə 6 kq-dır
- Toxumlar 5-6 °C istilikdə cücərir
- Geniş sahələrdə əsasən Kavkas, Taltos sortları və digər hibridləri (Qreqoria F<sub>1</sub>, Terranova F<sub>1</sub>, Sereneda F<sub>1</sub> və.s) əkilir
- Aprel ayı əkinlərində cücərtilər əmələ gəldikdən sonra cərgəaraları yumşaldılır, əsas yarpaq əmələ gəldikdən sonra dibləri doldurulur, tələb olunan sahədə seyrəltmə aparılır
- Seyrəltmə əsasən 2-ci əsas yarpaq əmələ gələn dövrdə aparılır



- Seyrəltmədən sonra cərgəaraları yumşaldılır və əlavə yemləmə gübrəsi verilir. Şəkər çuğunduru əkinlərində alaq otlarına qarşı tələb olunan yerlərdə mübarizə tədbirləri həyata keçirilir
- Vegetasiya müddətində bölgələrdən asılı olaraq sahə 4-5 dəfə suvarılmalıdır
- Suya tələbatı vegetasiyanın müxtəlif dövrlərində eyni deyildir.
- Toxumun cücərməsi və kök əmələ gəlmə dövründə bitki suya daha çox tələbat göstərir
- Üzvi maddələrlə zəngin strukturlu həmçinin zəif turş və neytral reaksiyalı (pH=6,5-7,5) torpaqlar çuğundur üçün daha əlverişli hesab olunur
- Digər bitkilərdən fərqli olaraq torpaqdan daha çox miqdarda qida maddələri mənimsəyir



Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi, 7 A



Çağrı Mərkəzi 1652



info@axa.gov.az



[www.axa.gov.az](http://www.axa.gov.az)



Aqrar Xidmətlər  
Agentliyi