



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

ÇƏMƏN KƏPƏNƏYİ (*Loxostege sticticalis* L)



088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Ön qanadlar bozumtul-qəhvəyidən zeytun-qəhvəyi qədərdir, tünd qəhvəyi və sarımtıl ləkələr və xarici kənarı boyunca solğun sarı zolaq var. Arxa qanadlar sarımtıl- bozrəngdədir, xarici kənarında iki paralel işıq zolağı var. Sakit halda kəpənəyin qanadları düz üçbucaq şəklində bükülür. Tırtılı yaşılmıtlı bozdur. Beli üzərində bütün bədən boyu aydın seçilən tutqun zolaq vardır. Başı qaradır. Uzunluğu 25-mm-dir. Çəmən kəpənəyi Azərbaycanda 3-4 nəsil verir.

Mübarizə tədbirləri

- Alaqaların məhv edilməsi;
- Cərgə aralarının becərilməsi;
- Tutucu feromon tələlərdən istifadə etmək.

Təsiredici maddəsi emomectin benzoat (0,7 l/ha), lambda-cyhalothrin (0,3-0,4 l/ha), indoxcarb (1,5-2 l/ha) və s. preparatların biri ilə kimyəvi mübarizə aparıla bilər. Məhsul yığımına 20 gün qalmış pestisidlərin istifadəsi dayandırılmalıdır.



Yetkin fərd



Zədəsi