



Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Aqrar Təlim Mərkəzi

Qarğıdalı bitkisinin
becərilməsi üzrə
təqvim planı

www.axa.gov.az

Qarğıdalı bitkisinin becərilməsi üzrə təqvim planı

Yanvar - Fevral



- Səpin və becərmədə istifadə olunan texnika və avadanlıqlar sazlanır, işlək vəziyyətə gətirilir
- Səpin materialı hazırlanır
- Toxumların keyfiyyəti və cücərmə qabiliyyəti laboratoriyada yoxlanılır

Mart



- Səpinqabağı kultivasiya işləri aparılır və əlaq otları məhv edilir
- Torpaq analizinin nəticələrinə əsasən gübrə normaları torpağa verilir
- Sahə hamarlanır və səpin üçün hazırlanır

Aprel



- Hektara dən üçün 18-20 kq, silos üçün 22-25 kq hesabı ilə səpin aparılır
- Toxum torpağın 5-6 sm dərinliyinə basdırılır
- Azotlu gübrələrin 30%-i səpinlə birlikdə verilir
- Əlaq otlarına qarşı torpaq herbisidləri səpinqabağı və ya səpindən sonra toxumlar cücərməmişdən qabaq tətbiq edilir
- Aran zonasında qarğıdalı səpini başa çatdırılır

May



- Birinci on günlükdə dağətəyi və orta dağlıq zonalarda səpin başa çatdırılır
- Azotlu gübrələrinin 30%-i torpağa verilir
- Cərgəarası kultivasiya və dibdoldurma işləri görülür
- Sahələrdə suvarma şırımları açılır və suvarılma aparılır
- Əlaq otları mexaniki yolla və ya herbisidlərlə məhv edilir
- Zərərvericilərə qarşı müşahidə və mübarizə aparılır

İyun



- Suvarma aparılır
- Azot gübrəsinin 40%-i növbəti kultivasiya ilə verilir
- Əlaq otları və zərərvericilərlə sirayətlənməyə uyğun mübarizə aparılır
- Anbarlar təmizlənilir və dezinfeksiya edilir

İyul



- Suvarma və kultivasiya aparılır
- Tozlanma prosesi daxil olmaqla bitkinin inkişafı nəzarətdə saxlanılır
- Zərərvericilərlə sirayətlənməyə uyğun mübarizə aparılır
- Yığım üçün texnika hazırlanır



Qarğıdalı bitkisinin mühafizə sxemi

Zərərli orqanizmlər	İstifadə olunan pestisidlər
Məftil qurdu	İmidacloprid (400 q/l)+Clothianid (100 q/l) 600ml/100 kq toxum
Qovuqlu sürmə, kök və gövdə çürüməsi, fuzarioz, bakterioz, toxumun kiflənməsi.	Thiram (400 q/l)+difenconazole (30 q/l) 3,0 kq/ton toxum
İkiləpəli alaqaların bütün növü və birləpəli alaq otlarına.	Glyphosate 500 q/l. 3,0-4,0 l/ha Əkindən qabaq torpağa səpilir.
Birillik ikiləpəli və birləpəli otlar.	Metribuzin 600 q/l 0,8-1,0 l/ha. Cücərtilər əmələ gəlməmiş torpağa səpilir.
Birləpəli və ikiləpəli alaqalar.	Nikosulfuron 40 q/l+mezotrion 70 q/l (1,0-2,0 l/ha) və ya Dicamba 120 q/l+2,4-D (dimetil amin duzu), 344 q/l (1,0-1,5 l/ha) İşçi məhlul 200-300 l/ha Qarğıdalı bitkisi 3-5 yarpaq olanda.
Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqalar.	Dicamba 480 q/l, (0,4-0,5 l/ha) və ya Mezostrion 150q/l+nikosulfuron 60q/l+tifensulfuron-metil 11,25q/l (0,5-1,0 l/ha).
Kök və gövdə çürüməsi, qıçaların fuzariozu və digər xəstəliklər.	Benomyl (fundazol) 500 q/kq (0,6-0,8 kq/ha).
Qarğıdalı və çəmən kəpənəyi, payız sovkası.	Cypermethrin 250 q/l (0,32-0,35l/ha) və ya İndoxacarb 150q/l (0,25-0,30 l/ha).

Qeyd: Pestisidlərin məsarif normalarına ciddi riayət olunmalı və lazım olduqda DAİM-də yerləşən Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzinin mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmək tövsiyə edilir.

